

Afázia terápia, logopédia

Afázia terápia

Az egyre fiatalabb korban jelentkező szív- és érrendszeri megbetegedések, például stroke következtében az agyvérzés, az agyi infarktus sokszor féloldali bénulással jár. Ha a bénulás a jobb oldalt érinti, akkor a beszéd, az írás, az olvasás és a számolás képessége is sérül. A beszéd- és nyelvhasználat képessége különböző genetikai betegségek, agydaganat, ritkább esetben külső sérülés, például baleset miatt is sérülhet.

A dizartria (dysarthria) olyan beszédzavar, ahol a beszédmozgások koordinációs kivitelezése, azaz a kiejtés sérül.

Az afázia (aphasia) olyan kommunikációs / nyelvi károsodás, ahol a nyelvhasználat képességének zavara áll fenn. Utóbbi esetben a beszéd két alapfunkciója közül a kifejező beszéd vagy a megértés, súlyosabb esetekben mindkettő sérül.

Mindkét esetben a logopédiai kezelés hamarabbi megkezdése javasolt.

Pontos prognózis sajnos nem adható. Az eredmény attól is függ, hogy milyen korai stádiumban kezdődött a kezelés, milyen a beteg életkora, személyisége, milyen a beteget körülvevő család összefogása és támogatása. Az eredményt a károsodás helye és nagysága is befolyásolja.

A beszédterápiát vezeti: Bartuschké Mónika logopédus, gyógypedagógus (06 20/361-2929)